



# Devianciák

---

Készítette:

Lupkovics Zsófia

Szociológia BA

Demonstrátor-Szociológia Tanszék

# Milyen devianciákat különböztetünk meg?

## 1. Bűnözés

Bűnözési statisztikai adataink 3 forrásból származnak:

1. rendőrségtől
2. ügyészségtől
3. bíróságtól

## 3. Kábítószer-élvezet

Meghatározó jellemzője a visszaélészerű fogyasztás, és az ebből fakadó következmények okoznak társadalmi és egyéni konfliktusokat.

2

## 2. Alkoholfogyasztás

Meghatározása nehézségekbe ütközik.

Akinek az alkohol az életben problémákat okoz.  
„Jellinek-képlet”

„Ledermann-módszer”

## 4. Mentális betegségek

Társadalmi beilleszkedés zavarok.

## 5. Öngyilkosság

„Minden olyan haláleset, amelyet közvetlenül vagy közvetve magának az áldozatnak valamilyen pozitív vagy negatív tette idézte elő, ha tudta, hogy aktusa szükségképpen erre az eredményre vezet.”

- **Deviancia:**  
Deviáns az a viselkedés, ami egy adott társadalom - egy adott korszakában érvényben lévő normáit megszegi.

# Bűnözés

Kategóriák:

1. Emberölés
2. Emberölés kísérlet
3. Gondatlan emberölés
4. Testi sértés
5. Közúti baleset okozása
6. Nemi erőszak
7. Ittas, bódult járművezetés
8. Kiskorú veszélyeztetése
9. Tartási kötelezettség elmulasztása


Számokban kifejezve:

2013-ban összesen 377829 regisztrált bűncselekmény.

2023-ban összesen 178172 regisztrált bűncselekmény.

-Látens vagy rejtett bűnözés.



- 
- Magyarországon a jogerősen elítélt bűncselekmények száma jóval magasabb a fiatalok körében.
  - A felnőttek körében a számok jóval alacsonyabbak.

1. táblázat folytatása

Év	Jogerősen elítélt	
	felnőttek/1000 fő	fiatalok/fő
1971	58	6 801
1972	64	7 171
1973	65	6 506
1974	65	5 725
1975	59	5 339
1976	66	5 931
1977	66	5 555
1978	67	5 512
1979	58	4 757
1980	55	4 613
1981	58	5 098
1982	58	5 527
1983	60	5 865
1984	57	6 290
1985	54	6 067
1986	59	6 513
1987	61	6 655
1988	61	6 220
1989	58	6 362
1990	42	5 156
1991	59	6 200
1992	70	6 898

# Alkoholfogyasztás

## Orvosi megközelítés

- Mennyiség és gyakoriság
- 2019-ben saját bevallás szerint 420 ezer ember, a 15 éves és annál idősebb férfiak csaknem tizede, a nők mindössze 1,5%-a volt nagyivó.
- A nagyivó férfiak hetente több mint 14, a nők több mint 7 pohár szeszes italt fogyasztottak el, vagy hetente rohamszerűen ittak.
- A 30–59 évesek között voltak a legkevesebben azok, akik sohasem ittak szeszes italt.
- A 75 évesek és annál idősebbek korcsoportjában fordult elő a leggyakrabban az italtól való teljes tartózkodás.
- Az emberek nagy többsége (a férfiak hét-, a nők hattizede) mértékletesen vagy csak ritkán, fogyasztott szeszes italt, ám a férfiak közt hatszor több a nagyivó és fele annyi az absztinens, mint a nőknél.


## Szociológiai megközelítés

- Akinél az alkohol az életében problémát, problémákat okoz

## Alapvető fogalmak, meghatározások

- A személy a szándéklotnál nagyobb mennyiségű szert fogyaszt, a tervezettnél hosszabb ideig
- A szerhasználat csökkentésére vonatkozóan sikertelen kísérleteket tesz
- A fogyasztásra és ahhoz kapcsolódó tevékenységekre jelentős mennyiségű időt fordít
- A szerfogyasztás utáni erős sóvárgás jellemzi

Szeszesital-fogyasztás korcsoportok és nemek szerint, 2019



# Sör vagy bor?


## Férfiak

- A legalább heti gyakorisággal italozó 15 éves és annál idősebb férfiak körében a sör a legnépszerűbb.
- A rövidital népszerűsége nemek szerint a legkiegyenlítettebb, a férfiak harmada, a nők bő negyede fogyasztotta.
- A sör- és a borivás a férfiak között egyértelműen korfüggő, a fiatalabbak között többen fogyasztottak sört és kevesebben bort.



## Nők

- A nőknek a háromtizede volt sörfogyasztó, náluk a bor állt az első helyen, közel kétszer annyi nő ivott bort, mint sört.
- A cidereket csak nagyon kevesen választják, de a nők (8,2%) háromszor annyian, mint a férfiak.
- A nők minden korcsoportban a bort részesítették előnyben .





# Kábítószer használat

- A kábítószeres és a gyógyszerek között nem húzható teljesen éles határ, sok kábító hatású fájdalomcsillapítót alkalmaznak az orvosi gyakorlatban is, de a stimulánsok és hallucinogének között is találunk hatóanyagot a gyógyítás területén. Ezért a kábítószerrel való visszaélés bizonyos esetekben átfedhet a gyógyszerfüggőséggel.
- Kábítószerrel való visszaélés alatt a különböző pszichés működésre ható szerek nem orvosi célú, az adott kultúra által elfogadott orvosi vagy társadalmi formákkal ellentétes, önkezdő adagolását értjük.
- A kábítószerrel való visszaélés célja általában a hangulat, tudat, mentális állapot befolyásolása.

**Dependencia, pszichés függőség:** a drog megszüntetése után fizikai, elvonási tünetek nem jelentkeznek. Azonban a sóvárgás olyan elviselhetetlen, hogy gyógyszeres terápiára is szükség van.

**Addikció, fizikai függőség:** a szer elvonását követően jellegzetes elvonási tünetegyüttes alakul ki, mely tünetei sokfélék lehetnek.

## Abúzuspotenciál:

- Az abúzuspotenciál a különböző hatóanyagoknak az a tulajdonsága, hogy mennyire képesek azonnali eufórikus, jó érzést kiváltani. Minél nagyobb az abúzuspotenciálja egy hatóanyagoknak, annál könnyebben alakul ki iránta függőség.



## Kábítószer fogyasztók gondozása

2016-ban kezelésen megjelent kábítószer fogyasztók:

Férfi: 9357

Nők: 4235

Ebből naponta fogyasztó: 5368 fő

Hetente fogyasztó: 3519 fő

Alkalomszerűen fogyasztó: 4126 fő

Ismeretlen: 579 fő

2006-ban Magyarországon 10477 férfi, és 9357 nő jelent meg kábítószer-fogyasztó kezelésen.

2016-ban Magyarországon 5003 férfi, és 4235 nő jelent meg a kábítószer-fogyasztó kezelésen.



# Kiből lesz alkoholista, drogfüggő?

---

## Alkoholizmus

- Az alkoholizmus erős testi hajlamra ráépülő lelki indíttatás nyomán alakul ki
- Függ tehát az öröklött és a környezeti tényezőktől is
- Örömeik és élmények hiánya
- Kulturális beszűkülés
- Pszichés és szociális problémák
- A környezet életvitelének példája is meghatározó (szocializáció és nevelés)
- Depresszió, szorongás

## Kábítószer használat

- Családpatólógia (milyen traumák érték)
- A személyiség defektusai, konfliktusai egybeesnek a drog elérhetőségével (például válás)
- Az ilyen családokban a hiány és a veszteség élményei uralkodnak, amelyek miatt a drogfüggőség könnyebben kialakulhat
- Pszichés-környezeti faktorok
- Genetikai sebezhetőség (nem tudnak kellő örömet átélni)
- Kíváncsiság, kísérletezés, rossz társaság

# Következmények



## Depresszió

Elszigeteltség, társas  
kapcsolatok hiánya



## Függőség

Kontrollálatlan viselkedés,  
környezetére és magára  
veszélyes



## Tévképzetek

Mentális problémák,  
elmezavar



## Életveszély

Túladagolás, öngyilkosság,  
halál



# Köszönöm a figyelmet!

---

- Ha sokáig nézel egy szakadékba, a szakadék  
visszanéz beléd.

-Friedrich Nietzsche

## Készítette:

Lupkovics Zsófia  
Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Szociológia BA